

HOUBLON

MILDIOU

Le temps fortement perturbé qui se maintient sur nos régions reste très favorable à de nouvelles contaminations, tant sur feuilles que sur cônes. Renouveler la protection fongicide avant le 24 août.

OIDIUM

Profiter de l'intervention contre le mildiou pour ajouter un anti-oïdium à la bouillie.

PUCERONS - ARAIGNEES ROUGES

Poursuivre les observations sur l'évolution de ces ravageurs afin d'intervenir si nécessaire.

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Le mildiou progresse très rapidement. Nous rappelons que les cultures de variétés sensibles arrivant à maturité doivent être défanées dès que possible.

Sur variétés tardives, prévoir une nouvelle protection, afin de maintenir le feuillage fonctionnel aussi longtemps que possible. Utiliser un fongicide classique.

BETTERAVES SUCRIERES

CERCOSPORIOSE

Les conditions climatiques actuelles (forte humidité et chaleur) sont très favorables au développement de la cercosporiose. Les premiers foyers existants pourront s'étendre rapidement.

Dans toutes les parcelles où des foyers sont observés, ne pas attendre pour intervenir.

CULTURES LEGUMIERES

POIREAU

TEIGNE DU POIREAU

Les vols de papillons se poursuivent. Un nouveau traitement insecticide est conseillé dans la période du 23 au 25 août. Ajouter un mouillant à la bouillie.

TOMATE

MILDIOU

Maintenir la protection sur les cultures de plein air.

CELERI

SEPTORIOSE

Sur variétés sensibles la septoriose marque une nette évolution. Sur cultures tardives, effectuer un nouveau traitement.